

Aus der
Universitäts-Hautklinik zu Marburg (Lahn)
Direktor: Prof. Dr. A. RUETE

Über einen Fall von
Mycofis fungoides

(klassischer Fall nach Alibert-Bazin)

Inaugural-Differtation

zur Erlangung der Doktorwürde

in der

ZAHNHEILKUNDE

der

hohen Medizinischen Fakultät der Philipps-Universität
zu Marburg (Lahn)

vorgelegt von


HEINZ ROSENSTOCK

Zahnarzt aus Fulda (Hessen-Nassau)

Marburg (Lahn)
November 1931

Angenommen von der Medizinischen Fakultät Marburg
am 10. Oktober 1931.

Gedruckt mit Genehmigung der Fakultät:
Referent: Prof. Dr. A. Ruete.



Die MYCOSIS FUNGOIDES ¹⁾, eine glücklicherweise sehr seltene Krankheit, (Ruete S. 116), stellt eine Affektion des Gesamtorganismus dar, die unter dem Bild einer chronischen progressiv verlaufenden Erkrankung der Haut auftritt, und bei der der Tod durch Marasmus erfolgt (Ruete S. 116).

Ihren Namen verdankt die Mycosis fungoides dem Franzosen Alibert seit dem Jahre 1832, der auch bereits auf die dem Tumorstadium vorangehenden Veränderungen der Haut hinwies. Nach K. Herxheimer und H. Martin (S. 174) erfolgte die erste Beschreibung bereits 1812 durch Bsnier und Doyen in der „Description de la Peau“ unter dem Namen „Pian Fongoide“. Es ist das Verdienst Bazins (Schüler von Alibert), in einer grundlegenden Arbeit zuerst auf ihre klinischen Symptome aufmerksam gemacht und auf die Entwicklungsphasen, die die Krankheit durchläuft, durch Aufstellung des folgenden Schemas hingewiesen zu haben. Seinen klinischen Erfahrungen gemäß unterschied er zwischen drei verschiedenen Stadien und zwar:

1. dem Stadium erythematofum,
2. dem Stadium lichenoides und
3. dem Stadium mycosoide.

Kaposi stellte später ein viertes Stadium fest, das Stadium ulcerationis.

Schließlich ergab sich für Kaposi und Köbner (1864) ein fünftes und letztes Stadium, das Stadium der Cachexie.

In der neueren Literatur hat sich (nach K. Herxheimer und H. Martin S. 177) eine vereinfachende Zweiteilung eingebürgert. Man trennt im Krankheitsverlauf ein prämycotisches, d. h. ein Stadium, das vor dem eigentlichen Auftreten der

¹⁾ Sprachliche Ableitung: mycosis aus dem Griech. - Pilz.
fungus aus dem Latein. - Schwamm, Pilz.

Tumoren liegt, und ein mycotisches Stadium, das durch das Auftreten der Tumoren gekennzeichnet wird. Zu dieser Einteilung äußert sich K. Herxheimer (S. 177) wie folgt: „Aber sie (die Einteilung) soll nicht dazu führen, das prämycotische Stadium als etwas Wesensverschiedenes vom mycotischen zu trennen, wie es aus der Bezeichnung geschlossen werden könnte. Prämycotische und mycotische Erscheinungen sind einander gleichwertig und ebenbürtig bezüglich ihrer Pathogenese, sie sind aber vom klinischen Standpunkt aus verschieden in ihrer Wertigkeit für die Diagnosefeststellung . . .“

Ehe ich mich weiter mit dem klassischen *Alibert-Bazin'schen* Typ der *Mycosis fungoides* beschäftige, möchte ich noch kurz auf die beiden Varietäten dieser letalen Erkrankung eingehen, die zwar innig mit dem *Alibert-Bazin'schen* Typ zusammenhängen und zusammen eine Krankheitseinheit darstellen, die aber bei dieser Arbeit ohne Berücksichtigung bleiben sollen. Es sind dies:

1. die Erythrodermische Form von „*Hallopeau und Besnier*“ (veröffentlicht 1892) auch diffuse Form (*Lederle*) der *Mycosis fungoides* genannt.

Sie unterscheidet sich vom *Alibert-Bazin'schen* Typ dadurch, daß sie durch ein einheitlicheres Symptomenbild eingeleitet wird, das seinen Ausdruck in einer „*Dermatitis exfoliativa universalis*“ findet. *Herxheimer* (S. 194) behauptet, daß die Erythrodermie in kurzer Zeit aus der gefundenen Haut heraus entsteht, die mit prämonitorischem Jucken beginnt, und daß dann regelmäßig mehr oder weniger spät mycotische Tumoren folgen.

2. Der Typ der „*Mycosis d'emblée*“, der von *Vidal und Brocq* (im Jahre 1885) beschrieben wurde, und von dem *Brocq* (*Darier*, S. 842) erklärte: „*Ce type est vraiment bien voisin des Sarcomes*“. Er charakterisiert sich dadurch, daß sich das Tumorstadium ziemlich rasch entwickelt, ohne daß irgend welche anderen Symptome der *Mycosis fungoides* vorangegangen sind, (*Frieboes*, S. 405) und in kurzer Zeit zum Exitus führt.

Der ALIBERT-BAZIN'sche Typ.

Das prämycotische Stadium tritt wenig charakteristisch auf. Jeder Körperteil kann befallen werden. Es zeichnet sich durch eine sehr große Vielseitigkeit im klinischen Bilde aus. Alle Erscheinungen der Haut, wie sie primär und sekundär auftreten können, werden von den Autoren beschrieben. Infolge der großen Vielseitigkeit sind diagnostische Irrtümer nicht selten vorgekommen, namentlich dann, wenn gleichzeitig primäre und sekundäre Effloreszenzen im Krankheitsbilde auftreten. In der Mehrheit der Fälle wird die Mycosis fungoides eingeleitet durch pruriginöse Erscheinungen. Nach *Lindenheim* (S. 463) können diese zwar vollkommen fehlen, aber andererseits sich so verstärken, daß der Juckreiz alle Skalen durchlaufen kann bis zu den qualvollen Graden des „Pruritus frénétique“ der französischen Autoren. Die dadurch ausgelösten Kratzeffekte können zu Furunkeln, Abszessen oder sonstigen Komplikationen führen.

Von einem vollkommenen Fehlen des Juckreizes berichtet *Daries*.

Mit dem Juckreiz treten die Effloreszenzen auf. Beispielsweise berichtet *Werther* vom primären Auftreten von Flecken und Knötchen, ebenfalls sah *Sederholm* die Mycosis fungoides mit einem roten juckenden Flecken in Erscheinung treten. Andere stellten wiederum pemphigusähnliche Blasen (*Köbner*) und Urticaria (*Dubring*) fest. *Schäffer* fand lichenruberplanusähnliche Anfangssymptome.

Nobl und *Sukman* beschreiben drei Krankheitsfälle, bei denen das Leiden mit Ekzemschüben von seborrhoischem Charakter begann.

Auch Schuppungen sind nicht selten. So stellte *Afzelius* das Auftreten ziemlich scharf begrenzter schuppender Flächen an den Seiten des Rückens fest.

Nach *Herxheimer* (S. 181) sahen *Pick*, *Völker*, *Lasser* und *Brandweiner* besonders häufig ein Krankheitsbild, das der Pforialis ähnelte. Auch *Frieboes* (S. 404) weist in seinem Handbuch darauf hin, daß es oft bei dem ewigen Wechsel der

Hauterscheinungen zur stärkeren Persistenz der ekzematösen Stellen und deren Vergrößerung kommt, sodaß sie oft größere Areale des Körpers befällt, ja es kann schließlich die ganze Körperhaut inkl. Kopf und Extremitäten von solchen ekzematösen Veränderungen bedeckt sein, wobei dann die Haut einen eigentümlichen roten Farbton bekommt und stärker zu schuppen pflegt. Die Farbe der genannten Ekzemherde kann die gleiche sein wie bei gewöhnlichen, leicht infiltrierten Ekzemen, doch herrscht hier auch schon oft eine eigentümliche Farbe vor, eine Farbnuance, die den Verdacht auf *Mycosis fungoides* aufkommen läßt. Nach *Lindenheim* (S. 462) bemerkte *Wolters*, daß manchmal hämorrhagische Flecken auftreten. *Wickham* beschreibt einen Fall mit Purpura-Blutungen und *Lindenheim* selbst einen solchen mit zahlreichen Petechien.

Die Pigmentierungen spielen ebenfalls im ersten Stadium eine Hauptrolle für die Erkennung der Erkrankung. Sie treten jedoch meistens erst gegen Ende der prämycotischen Periode auf. Beispielsweise sei ein von *Brandweiner* (S. 416) niedergelegter Fall angeführt: „Andere Effloreszenzen waren von bräunlich tingierten Borken bedeckt. Die vorerwähnten Knötchen blieben oft sehr lange Zeit bestehen, flachten ab und schwanden schließlich unter Hinterlassung von bräunlichen Pigmentationen . . . “.

Auch *Habermann* behandelte einen typischen *Mycosis*-kranken, bei dem in der letzten Zeit flächenhafte Melanose von außerordentlicher Intensität auftrat.

Werther berücksichtigt die Pigmentation wie folgt: „... besonders merkwürdig aber ein diffus verteiltes, dunkles, schwarzesbraunes Pigment. Letzteres stieß sich mit der Hornschicht ab und erneuerte sich von unten herauf“.

Weiter kennzeichnend für das prämycotische Stadium ist ganz besonders die Infiltration der Haut, die in einem solchen Ausmaße auftreten kann, daß z. B. beim Befallensein des Gesichtes sich dieses mit einer „*Facies leontina*“ vergleichen lassen kann (*Herxheimer*, S. 186). *Laubal* erwähnt, daß bei einem 52jährigen Patienten die Haut des ganzen

Körpers hyperämisch diffus infiltriert war, und daß die Infiltration im Gesicht zu einer Facies leontina geführt hatte. Die Infiltration entsteht erst gegen Ende des prämycotischen Stadiums. *Arzt* weist dies an einem Fall nach, den er längere Zeit unter Kontrolle hatte. Der Anfang der Erkrankung lag im Jahre 1926, und zwar mit einem ekzematösen Vorstadium. 1929 war die Krankheit so weit vorgeschritten, daß neben Rötung und Schwellung (hilling große, derb infiltrierte Herde vorwiegend an den Extremitäten vorgefunden wurden.

Die Dauer des prämycotischen Stadiums ist von den verschiedenen Autoren sehr unregelmäßig angegeben worden und beträgt nach *Lindenheim's* Ausführungen 1 bis 30 Jahre. Bei diesen Zahlen habe ich die von ihm angegebene kürzeste und längste Zeit berücksichtigt. Nach *Paltauf* (S. 714) kommt die Krankheit am häufigsten im Alter von 20 bis 30 Jahren vor sowie im Alter von 40 bis 60 Jahren und befällt vorwiegend das männliche Geschlecht; *Gerwig* hat gefunden, daß die Männer zu 62% an der Gesamterkrankung beteiligt sind. Nach *Lindenheim* (S. 461) ist die *Mycosis fungoides* der weißen Rasse besonders eigentümlich. Aus einer von *Gerwig* graphisch dargestellten Kurve ist ersichtlich, daß die Häufigkeit des Vorkommens im Anfang dieses Jahrhunderts bis 1928 außerordentlich zugenommen hat, besonders auch im Deutschen Reich. (1907 ungefähr 8 Fälle, 1913/1914 ebenfalls 8 Fälle, dagegen 1928 annähernd 20 Fälle.)

Es sind auch einige wenige Fälle bekannt, in denen die *Mycosis fungoides* bei Negern (in 2 bis 3 Fällen) (*Wolff*) und bei einem marokkanischen Eingeborenen (*Decroix* und *Salle*) einwandfrei diagnostiziert werden konnte.

Ebenfalls ist bis jetzt weder ihre Vererbung noch ihre Übertragbarkeit einwandfrei festgestellt worden. (*Darier*, S. 844). Allerdings möchte ich im Anschluß hieran auf eine Veröffentlichung *Gougerot's* im „Bulletin Société Française de Dermatologie et de Syphiligraphie“ hinweisen, in welcher berichtet wird, daß diese seltene Krankheit in zwei benach-

barten Familien, die näher mit einander bekannt waren, fast zur gleichen Zeit aufgetreten ist.

Der Übergang vom prämycotischen zum mycotischen Stadium findet in der Mehrzahl der Fälle allmählich statt, aber wir sprechen von diesem Stadium stets erst nach dem Auftreten der Tumoren. Diese können jedoch auch ganz plötzlich (nach Angaben der Patienten entstehen sie über Nacht,) auftreten, und zwar in ganz verschiedenen Ausmaßen und in ganz beliebiger Anzahl erscheinen.

Mit dem Entstehen der Geschwülste ist die einwandfreie klinische Diagnose gesichert; dabei ist jedoch zu beachten, daß in diesem Stadium stets auch prämycotische Erscheinungen vorhanden sind bzw. sein können. *Zumbusch* konnte bei fünf Fällen im Tumorstadium noch massenhafte prämycotische Examtheme sehen. Was die Prädilektionsstellen für die Tumoren anbelangt, so gilt für sie daselbe wie für die prämycotischen Erscheinungen: Besonders bevorzugte Stellen sind nicht vorhanden.

Charakteristisch für die mycotischen Geschwülste ist ihre Ähnlichkeit mit Paradiesäpfeln, die schon von den ersten Beobachtern hervorgehoben wurde, doch kann ihre Farbe auch dunkelviolett bis schwärzlich sein. (*Joseph*). Die Tumoren sitzen breit oder gestielt auf ihrer Unterlage. Ihre Konsistenz ist verschieden. In der Hauptsache zeichnen sie sich durch ganz besondere Weichheit und Hinfälligkeit aus und neigen gern zu Ulcerationen, sodaß sie sekundären Infektionen leicht zugänglich sind. Sie besitzen die Tendenz, sich in jedem Zeitpunkt peripher auszudehnen und haben das Vermögen, analog den prämycotischen Hautveränderungen sich zurückbilden und spurlos verschwinden zu können, sodaß eine Heilung oft vorgetäuscht wird. Es ist dies eine Eigenart, die die mycotischen Tumoren von den echten Geschwülsten epithelialen und bindegewebigen Ursprungs streng unterscheidet. Bei den Resorptionvorgängen kommt es zu Vertiefungen, und es treten in der Mitte der Erhebungen Nekrosen auf. Dadurch kommt es zu annulären Bildungen, die auch in der prämycotischen Periode, dem

Stadium der Exantheme, eine Rolle spielen. Beim Auftreten von Nekrosen bilden sich oft stark sezernierende Geschwüre aus, die zu schweren Veränderungen, z. B. zu Zerstörungen von Gelenken, zur Bloßlegung von Knochen usw. führen können. Es ist dann selbstverständlich, daß unter diesen Umständen nur eine Abheilung unter Narbenbildung eintreten kann.

Verhältnismäßig selten findet ein Übergreifen der mycotischen Erscheinungen auf die sichtbaren Schleimhäute, insbesondere auf die Mundschleimhaut, statt. Solche Affektionen stellen ein ungewöhnliches Vorkommnis dar und sind stets nur als Teilercheinungen einer intensiv verlaufenden bzw. einer sehr weit fortgeschrittenen Mycosis fungoides zu werten. Bei ihrem Auftreten muß die Prognose sehr ungünstig angesehen werden. Beobachtet wurden die Veränderungen sowohl beim klassischen Typ der Mycosis fungoides als auch bei den bereits oben erwähnten beiden Abarten (*Herxheimer*, S. 202). Doch dürften sie kaum jemals isoliert im Munde auftreten und als mycotische Erscheinungen erkannt werden. (*Zinsser*).

Arita sah z. B. einen furunkelähnlichen Knoten an der Lippe bei weiterem Vorhandensein von mycotischen Veränderungen am übrigen Körper.

Stefani berichtet von einem Mycosiskranken, bei dem das Zahnfleisch beider Oberkiefer, das Gaumendach, beide Tonsillen von mehr oder weniger großen ulcerierten und zerklüfteten Tumoren befallen waren, deren histologische Untersuchung in Übereinstimmung mit der klinischen Diagnose die Charakteristika der Mycosis fungoides aufwies.

Sachs veröffentlichte einen Fall, bei dem blasige Effloreszenzen und oberflächliche Ulcerationen an Lippe, Zunge und weichem Gaumen besonders auffällig waren.

Trautmann führt einen Obduktionsbefund von *Hallopeau* und *Jeanselme* aus dem Jahre 1892 an, wo Tumoren am Velum palatinum und am Larynx gefunden wurden.

Auch *Vollmer* beschreibt neben braunroten Knoten im Gesicht und am Körper auch einen mycotischen Tumor an der Unterlippe.

Gödel (Fall 1) fand ebenfalls bei einer Autopsie am weichen Gaumen, und zwar an dessen hinterer, dem Rachenraum zugekehrten Fläche, rechts seitlich der Uvula einen wallnußgroßen Tumor mit aufgeworfenen derben, z. T. zerklüfteten Rändern von rötlicher Farbe und einem unregelmäßigen, höckerigen Grunde von blaßgelblich weißer Farbe.

Crull berichtet, daß sich am Zungengrund ein markstückgroßes Geschwür mit stark aufgeworfenem Rand und derbem Boden, ähnliche kleinere Geschwüre am weichen Gaumen und eine harte, diffuse Verdickung unter der intakten Schleimhaut des Kehlkopfeinganges fand.

Riecke stellt einen weiteren Fall vor: Der Mund kann nur noch wenig über Zentimeterbreite geöffnet werden; am harten Gaumen und am linken Oberkiefer ausgedehnte Ulcerationen. Dieselben verursachen lebhafte Schmerzen, namentlich beim Essen und Trinken. Die Ernährung kann nur nach vorheriger Pinselung mit Cocain durch Röhrchen erfolgen.

Das Allgemeinbefinden verschlechtert sich im Verlauf der Erkrankung mehr und mehr, bedingt durch psychische und körperliche Ursachen. Durch den anhaltenden Juckreiz erlebt man es, daß Patienten jahrelang an Schlaflosigkeit leiden. Durch Übergreifen der Tumoren auf die inneren Organe, das nicht auf dem Wege der Metastasen erfolgt, sondern als eine den Hautveränderungen analoge Bildung anzusprechen ist (Eichler, S. 322), kommt es zum Schwund der Körperkräfte. Es tritt Siechtum ein, und nicht selten wird der Exitus durch Hinzutreten einer Infektionskrankheit beschleunigt bezw. herbeigeführt.

Temperaturerhöhungen können besonders im Tumorstadium auftreten, und die Fieberkurven zeigen stets das typische Bild einer Sepsis. Da sie sekundär bedingt sind, müssen sie vom Krankheitsbild der Mycosis fungoides abgetrennt werden.

Von den Allgemeinererscheinungen, die von jeher das Interesse der Autoren in Anspruch genommen haben, sind die Blut- und Lymphdrüsenveränderungen als die hauptsächlichsten

zu nennen. Nach *Paltauf* (S. 712) wurden sie als regionäre Erscheinungen in Beziehung gebracht mit der Haut, den infolge des intensiven Juckreizen auftretenden Kratzeffekten, mit sekundären Ekzemen, Pusteln und mit von denselben ausgehenden Infektionen. Nicht selten sind die Drüfenschwellungen abhängig von der Lokalisation des Hauptprozesses, sodaß auch ferner selbst bei univerrer Ausbreitung nur die oberflächlichen subkutanen Lymphdrüsen beteiligt sind. Nach *Lindenheim* (S. 464) sind im ersten Stadium die Drüfenschwellungen meistens noch gering, man muß nach ihnen suchen. Die voluminösen Drüsen, wie wir sie im mycotischen Stadium finden, fehlen hier noch völlig. Es berichten beispielsweise *Nobl* und *Sukman* von einem Mycosiskranken, daß bei diesem eine fast vollkommen „harte Schwellung der Lymphdrüsen“ vorlag.

Ferner veröffentlichten *Milian* und *Périn* einen Bericht über einen Fall, der von einer starken inguinalen Drüfenschwellung, weniger starken Schwellung der submaxillaren, axillaren, hinteren perikalen und mastoiden Lymphdrüsen begleitet war. Alle Drüsen waren hart, beweglich und schmerzhaft.

Bereits *Köbner* (nach *Paltauf*) hat angegeben, daß Lymphdrüfenschwellungen vollkommen fehlen können.

Laut *Pautrier* und *Levy* wurden bei dem von ihnen behandelten Fall auch keine Lymphdrüfenschwellungen vorgefunden.

Eine gleiche Feststellung machte auch *van Leuwen*.

Bei Drüsenveränderungen ist die Haut über den Drüsen unverändert, nicht infiltriert und leicht verschieblich. Ihre Konsistenz ist meistens derb-elastisch. Sie sind weder spontan noch auf Druck schmerzhaft, solange nicht eitrige Einschmelzungen als Zeichen entzündlicher Prozesse auftreten.

Ebenfalls sind fast bei jedem Mycosisfall Veränderungen im normalen Blutbild nachgewiesen worden. Ausnahmen, bei denen eine hämatogene Untersuchung normalen Blutbefund oder nur eine ganz geringe Abweichung davon ergab, sind verhältnismäßig selten.

Olion berichtet über einen 39jährig. Mycofiskranken, bei dem der Blutbefund bei einwandfreier Diagnofestellung normal war.

Auch *Arzt* führt einen Fall an, bei dem der Blutbefund fih ohne krankhafte Veränderungen zeigte.

Ferner lautet ein Bericht *Unna's*: „Blutbild zeigt nichts Befonderes.“

Schließlich geben *Schwartz* und *Busmann* bekannt, daß bei einer 39jährigen Patientin, deren Erkrankung vor 12 Jahren begann, die zahlenmäßige Zufammenfetzung des Blutes und der Blutdruck normal waren.

Es find die verfhiedenartigften Blutbefunde in Mycofis-fällen feftgeftellt worden, in denen die Mycofis fungoides durch hiftologifche und klinifche Unterfuchung diagnoftiziert war. (*Mariani* S. 859). Die Blutveränderungen befehen allgemein in einer Vermehrung der weißen Blutkörperchen, der eofinophilen Zellen und der mononucleären Zellen, im Auftreten von neutrophiler Leukocytofe, einer Steigerung des Maftzelligehaltes und einer Verminderung der roten Blutkörperchen.

Nach *Spiehoff* ftellen die Eofinophilen, die in allen drei klinifchen Erfcheinungsformen und in beiden Stadien der Mycofis fungoides nachgewiefen wurden, durch ihr reichliches Vorkommen einen konftanten Faktor dar.

Paltauf (S. 707) weist an Hand einer Tabelle nach, daß die Anfammlung der Eofinophilen eine Anhäufung von 23%, 37% ja 54% über die Norm hinaus betragen kann. Ebenfalls zeigte fih eine Zunahme der Mononucleären bis zu 60%. Er glaubte, daß in der Kombination der eofinophilen mit den mononucleären Zellen eine Möglichkeit befehe, eine für die Mycofis fungoides charakteriftifche und immer geltende Blutformel aufzuftellen. Doch ift diefe Annahme abzulehnen, da nach *Herxheimer* (S. 206) Mononucleofe ohne gleichzeitiges Auftreten der Eofinophilie beobachtet worden ift.

Nach *Darier* (S. 844), den auch *Herxheimer* anführt, gibt es keine charakteriftifche Blutformel für diefe fchwere Erkrankungsforn, weder für das Anfangsfadium noch für das bereits vorgefchrittene Stadium.

Auch *Frieboes* (S. 406) steht auf demselben Standpunkt: „Der Blutbefund ist für diese Affektion wenig charakteristisch.“

In diesem Sinne äußert sich ebenso *Mariani*: „Die Blutformel hat bei der *Mycofis fungoides* einen sehr geringen diagnostischen Wert“.

Weiter sind im Krankheitsverlauf Schwankungen im Hämoglobingehalt festgestellt worden.

Unna fand bei einer 40jährigen Frau, die 12 Jahre lang an mycofiden Veränderungen der Haut litt, eine Herabsetzung des Hämoglobingehaltes.

Auch *Riecke* (Fall 1) fand eine Verminderung des Hämoglobingehaltes um 48%.

Diese Feststellungen lassen keine bestimmten Folgerungen zu; (*Herxheimer*, S. 208) denn sie geben uns alle zur Klärung der Ätiologie keinen Fingerzeig, noch vermögen wir durch sie, die Diagnose „*Mycofis fungoides*“ einwandfrei zu stellen.

Befondere Beachtung verdienen die histologischen Veränderungen, die die Haut im Verlauf der Erkrankung durchmacht; denn gerade in der Kombination des histologischen Bildes mit dem klinischen Befund besteht die Möglichkeit, die Diagnose „*Mycofis fungoides*“ frühzeitig und mit Sicherheit zu stellen.

Durch die eingehenden Untersuchungen dieser Art wurde die Erkenntnis dieser Erkrankungsform vertieft.

Den Ausgangspunkt aller histologischen Veränderungen bildet das unter der Oberhaut und dem Papillarkörper gelegene subpapilläre Gefäßnetz der Haut (*Gans*, S. 566). Nach *Unna* (S. 507) bestehen die pathologischen Vorgänge zunächst in einer progressiven Wucherung der Bindegewebszellen, zuerst um die Kapillaren der Papillarbahnen und des subpapillären Gefäßnetzes, sehr bald jedoch des gesamten Papillarkörpers und zwar in einer sehr gleichmäßigen Weise, sodaß nach einiger Zeit der obere Teil des Cutis bis an das obere Gefäßnetz eine starke Zellinfiltration aufweist, ohne daß ein Teil bevorzugt wäre. Die Erweiterung der Blut- und der Lymphbahnen zeigt sich deutlich, während sich die Endothelien in unverändertem Zustand befinden. Nach

Brandweiner (S. 424) weisen die Gefäße eine starke Blutfüllung auf.

Paltauf und *Wolters* berichten von dem normalen Verhalten der elastischen Fasern und der Hautanhangsgebilde im Beginn der Erkrankung. Das im prämycotitischen Stadium bandförmig angeordnete Infiltrat charakterisiert sich durch Polymorphie der Zellen (*Herxheimer*, S. 231) und zwar bilden den Hauptbestandteil Zellen mit runden Kernen chromatinreich, mit spärlichem Protoplasmarand, also Lymphocyten (*Lindenheim*, S. 466). Außer diesen erwähnt *Brandweiner* (S. 424) noch größere polygonale, protoplasmareiche Rundzellen, die in wechselnder Zahl, jedoch nicht reichlich, vorhanden sein können.

Weiter treten Riesenzellen auf. Dies sind mehrkernige Zellen, die nach *Gans* (S. 569) ein noch völlig normales, schaumiges, durchaus nicht homogenisiertes Protoplasma besitzen. Ferner ist nach *Brandweiner* (S. 424) das Vorkommen von Mastzellen im Infiltrat sehr gering; *Herxheimer* (S. 226) sieht in ihnen einen unbeständigen Faktor. Sie zeigen in den tieferen Cutisabschnitten ihr typisches Aussehen, während sie sich in den ödematösen Gewebsschichten, also den Schichten, die sich über dem Stratum subpapillare befinden, als langspindelige, stern- oder spinnenartige Formen mit dicht angehäuften Granulis zeigen (*Gans*, S. 569).

Plasmazellen sind nur vereinzelt zu beobachten (*Unna*, S. 508), und zwar macht *Vollmer* darauf aufmerksam, daß sie fast ausschließlich in der Nähe der Blutgefäße auftreten.

Unna erzieht daraus, daß zwar zunächst eine Neigung besteht, diese Zellen zu bilden, daß aber jedoch besondere Verhältnisse ihrer definitiven Ausbildung und ihrem Bleiben hindernd in den Weg treten müssen.

Die neutrophilen polymorphkernigen Leukocyten machen einen bedeutungslosen Bestandteil des mycotischen Infiltrates aus (*Herxheimer*, S. 226).

Ebenfalls fand *Lindenheim* (S. 467) nur wenig Leukocyten vor.

Größere Beachtung zollt man dem Vorkommen der eosinophilen Zellen (*Ruete*, S. 117).

Kyrle (S. 276) äußert sich dahingehend, daß durch ihr Auftreten das Infiltrat ein bestimmtes Gepräge erhält, und daß beim Vorfinden solcher Zellformen der Verdacht auf mycotische Veränderungen von vornherein naheliegt.

Auch *Frieboes* (S. 225) vertritt die Ansicht, daß durch die eosinophilen Zellen die Zugehörigkeit des Infiltrates zum Krankheitsbild der *Mycosis fungoides* wahrscheinlich oder sicher gemacht wird. *Herxheimer* (S. 225) sieht in ihnen ein geläufiges und durchaus regelmäßiges oder nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten gerichtetes Vorkommen. Ganz besonders erwähnt er (S. 222) eine Zellart, die Mycosiszelle, auf deren Bedeutung bereits *Paltauf* und seine Mitarbeiter unter der Bezeichnung „der mono- oder uninucleären Zelle“ hingewiesen haben. Solche Zellen sind unregelmäßig im Infiltrat verteilt, ähneln den epitheloiden Zellen, zeichnen sich zuweilen durch mehrere lange Protoplasmafortsätze und exzentrische Lage des Kerns aus und gewinnen dadurch ein Aussehen, das an Fibroblasten erinnert.

Die Mannigfaltigkeit des Infiltrates wird durch den frühzeitig einsetzenden Kern- und Zellzerfall sowie durch die große Zahl der fein- bis grobkörnigen Kernbröckel und Protoplasmae Reste erhöht. (*Unna* S. 509). *Brandweiner* stützt *Unna's* Ansicht (S. 424). Auch er konnte Zerfallsprodukte, die frei und in großer Anzahl im Gewebe lagen, in mikroskopischen Schnitten nachweisen.

Nach *Mariani* (S. 853) wird der Polymorphismus noch durch eine unregelmäßige und mannigfaltige Verteilung der Zellen erhöht.

In den tieferen Schichten der Subcutis finden keine pathologischen Veränderungen statt (*Brandweiner*, S. 424), während sich solche in den Schichten über dem Infiltrat weitgehendst bemerkbar machen; besonders im Stratum papillare zeigen sich fast immer größere Odembildungen. Die Epidermis, die sich sehr verschiedenartig und entsprechend den makroskopischen Hautveränderungen verhält, zeigt nichts Charak-

teristisches, was der Diagnosestellung zu Gute kommen könnte, da dieser Vorgang rein mittelbarer Natur und umso ausgeprägter ist, je näher das mycotische Infiltrat der subpapillären Schicht an das Epithel heranrückt (*Gans*, S. 569). *Herxheimer* (S. 233) erklärt sich das fast gegensätzliche Verhalten der Epidermis folgendermaßen: Wird durch das Infiltrat auf die Epidermis ein Reiz ausgelöst, so wuchert das Epithel, die Retezapfen verbreitern und verlängern sich und lassen als Kennzeichen des pathologischen Geschehens reichlich Kernteilungsfiguren erkennen. Verhält sich dagegen die Epidermis passiv, so tritt eine Verdünnung derselben und eine Verkürzung der Retezapfen ein.

Im mycotischen Stadium setzt sich das Infiltrat aus denselben Zellen zusammen wie im Initialstadium, wenn auch im allgemeinen das Überwiegen der Rundzellen besonders vorherrscht. Es findet ein intensives Tiefenwachstum des Infiltrates statt (*Herxheimer* S. 234). Im allgemeinen reicht es bis dicht über das Fettgewebe und zerfasert das kollagene Gewebe (*Brandweiner* S. 425).

Gegenüber dem Vorstadium machen sich jetzt auch weitergehende Veränderungen an den Gefäßen und Endothelien bemerkbar. *Unna* (S. 113) fand sie mit hyalinen Massen durchsetzt, teils in erweitertem, teils auch in zusammengefallenen Zustand. Dasselbe beobachteten *Mayr* und *Eichler*.

Durch die Konsistenzvermehrung des Infiltrates wird ein Druck auf die Hautanhangsgebilde ausgeübt, sodaß diese atrophisch werden können und schließlich ganz verschwinden (*Gans*, S. 570). Oft kommt es dabei auch zum völligen Schwund der obersten Hautschichten. Ist das letztere der Fall, so ist dem Eindringen von Infektionserregern keine Schranke mehr gezogen. Da das Infiltrat mit den reichen Zerfallsprodukten einen idealen Nährboden (*Unna*, S. 514) darstellt, so ist es erklärlich, daß sekundäre Infektionen so überaus zahlreich an mycotischen Geschwülsten auftreten.

Die histologischen Veränderungen der erkrankten Schleimhautabschnitte sind die gleichen, wie sie an der äußeren Haut gefunden werden.

Gödel untersuchte einen haselnußgroßen Knoten am weichen Gaumen (vgl. S. 10). Er gibt davon folgende Darstellung: „Von der Gaumenschleimhaut ist an der Stelle der stärksten Vorwölbung des Knotens nur mehr das vielfach geschichtete Plattenepithel zu sehen, das kontinuierlich und unverändert darüber hinwegzieht. Tunica propria und submucofa sind eingenommen von einem dichten Zellinfiltrat. Dies zeigt mit charakteristischer Deutlichkeit die Zusammensetzung aus polymorphen Zellformen. Die Zellen liegen wirr durcheinander, meist sehr dicht in einem ganz deutlichen zarten, da und dort auch durch derbere Fasern verstärkten Retikulum mit zahlreichen, weiten, strotzend mit Blut angefüllten Kapillaren. Die Infiltratzellen sind auch zwischen und in den Schleimdrüsen tief in die Submucofa gedrungen, sodaß nur noch Reste von Drüenschläuchen inmitten der Zellenmassen zu erkennen sind.“

Aus der Schilderung der prämycotischen Hauterscheinungen, die in ihrem wechselvollen Bild größere Ähnlichkeiten mit einer ganzen Reihe der verschiedensten Dermatosen haben können, ist zu entnehmen, daß die Diagnostizierung der Mycosis fungoides eines der schwierigsten Kapitel der Dermatologie darstellt. Eine klinische Diagnose nur auf Grund der prämycotischen Erscheinungen zu stellen, ist kaum möglich. Zwar läßt sie sich vermutungsweise aussprechen mit umso größerer Wahrscheinlichkeit, je stärker und ausgesprochener die angegebenen allgemeinen Anhaltspunkte vorzufinden sind (Herxheimer S. 248).

Nach Paltauf (S. 750) ist es am Beginn und im ersten Stadium unmöglich, die Diagnose nur allein aus den klinischen Erscheinungen zu finden. Wohl läßt er die Möglichkeit gelten, an die Existenz dieser Erkrankung zu denken, wenn ein älteres Individuum an chronischen, heftig juckenden erythematösen und ekzemartigen Veränderungen der Haut leidet, die mit Pigmentverschiebungen verbunden sind und dauernd rezidivieren.

Im mycotischen Stadium allerdings ist die Diagnose auf Mycosis fungoides des Alibert-Bazin'schen Typ nicht mit all-

zu großen Schwierigkeiten verknüpft. Das Auftreten der Tumoren ist für die beschriebene Erkrankung so charakteristisch, daß die Diagnose damit in den meisten Fällen geklärt sein dürfte. (*Paltauf* S. 751). Aber trotzdem ergibt sich die dringende Forderung, schon um Irrtümer zu vermeiden und um differential-diagnostisch klar zu sehen, die zunächst nur klinisch diagnostizierte „*Mycosis fungoides*“ hämatologisch und histologisch nachzuprüfen und so zu festigen.

Gerade den mikroskopischen Befunden ist bei der Diagnosestellung ein besonderer Wert beizulegen, und es dürften (nach *Paltauf*) keine Bedenken bestehen, denselben sogar eine ausschlaggebenden Bedeutung zuzusprechen, wenn sie mit den klinischen Untersuchungsergebnissen zu vereinbaren sind. Dadurch werden von vornherein Verwechslungen mit leukämischen Tumoren, Lepra, Sarkomen und Spieglerischen Endotheliomen vermieden. (*Ruete*, S. 117).

Die Ätiologie der *Mycosis fungoides* ist bis jetzt ungeklärt. Zwar deutet ihr Name auf parasitäre Natur der Erkrankung hin, aber es ist trotz der eingehendsten Untersuchungen nicht gelungen, einen spezifischen Erreger oder einen eindeutigen Hinweis, der die Krankheitsursache ergründet, zu finden. Daher kommt es, daß der histologische Befund der mycosiden Infiltrate vor allem den Anhaltspunkt abgeben mußte, das Wesen der Erkrankung zu ergründen. Im Laufe der Zeit sind sehr verschiedene Ansichten geäußert worden. Im wesentlichen können nach *Herxheimer* (S. 238) vier Theorien unterschieden werden.

1. Die französische Schule der ältesten Zeit hielt die Erkrankung für eine leukämische oder pseudoleukämische Affektion der Haut, die ihre Ursache in einer Schädigung des blutbildenden Systems habe. Begründer dieser Anschauung ist *Ranvier* (*Herxheimer*, S. 175), der in den mycosiden Tumoren lymphatisches Gewebe erkannt zu haben glaubte (*Paltauf*, S. 768). Sein Schüler *Gillot* baute diese Theorie weiter aus und bezeichnete die *Mycosis fungoides* als „*lymphadenie cutanée*“ den Ausdruck für eine „*diathese lymphatique*“ (*Herxheimer*, S. 175).

2. Spätere Autoren, wie *Kaposi*, *Funk* und *Port*, rechneten diese Erkrankungen zu den Hautfarkomen, und sie betonten vor allen Dingen die Ähnlichkeit der *Mycosis fungoides d'emblée* mit farkomatösen Geschwülsten. Als besondere Stütze zogen sie das Auftreten der Tumoren an den inneren Organen, die sie sich auf metastatischem Wege entstanden dachten, heran. *Paltauf* (S. 722) lehnt diese Auffassung mit folgenden Worten ab: „Diese Geschwülste sind nur Teilerrscheinungen einer Krankheit, in der sie typisch als charakteristisches Glied einer Reihe von Erscheinungen auftreten. Sie sind nicht mit dem Begriff Sarkom zu vereinen.“ Auch *Ullmann* vertritt den gleichen Standpunkt. Die mycotischen Tumoren unterscheiden sich von den Sarkomen durch die Vielgestaltigkeit der Zellelemente, durch das Fehlen der Gefäßneubildungen und das Fehlen der Leukocyten.
3. Andere Autoren sind schließlich der Ansicht, daß die *Mycosis fungoides* ein Krankheitsbild sui generis sei, das eine Mittelstellung zwischen echten Geschwülsten und entzündlichen Granulomen einnehme.
4. Die z. Zt. am meisten anerkannte Anschauung ist die, daß es sich um Granulationsgeschwülste infektiös-entzündlicher Natur handelt, wie sie häufig durch Bakterien, Bakterientrümmer oder Stoffwechselprodukte entstehen können. Obwohl viele Gründe dafür sprechen, ist es aber bis jetzt noch nicht gelungen, auf experimenteller Grundlage einwandfreie Beweise dafür zu erhalten. Hier sei der Veröffentlichung *Brünauer's* gedacht, dem es bei einem Meerfischweinchchen gelang durch Taschenimpfung der Bauchhaut mit dem Gewebe der mycotid veränderten Innenorgane einer Mycotiskranken, Veränderungen an den Innenorganen des Versuchstieres hervorzurufen, die histologisch weitgehende Übereinstimmungen mit der *Mycosis fungoides* zeigten. Nach *Kyrle* (S. 280) bedeutet dieses Ergebnis seit langem der einzige Fortschritt in der Klärung des Mycotis-Problems. Die anderen Arbeiten auf experimentellem Wege sind mit größter Vorsicht aufzunehmen, da

sie im allgemeinen nicht über die Anfänge hinaus gekommen sind.

Entsprechend diesen verschiedenen Theorien ist seit Klärung des Krankheitsbildes durch *Alibert-Bazin* vielfach versucht worden, therapeutisch eine Besserung der stets zu Tode führenden Erkrankung herbeizuführen, oder ein Medikament von spezifischer Wirkung gegen sie zu finden. Von den Versuchen, antiparasitär gegen ein angenommenes Virus zu wirken, seien die Jod-Quecksilberbehandlungen (*Abraham & Sachs*), die Injektionen mit sterilen Stoffwechselprodukten von abgetöteten Streptokokken (*Martin-Roux*), Coli-Auto-vaccinationen (*Wills & Headfields*) und die Anwendung von Chinin (*White & Burns*), ferner die therapeutischen Impfungen von Erysipelstreptokokken (*Lenchow*) und Einspritzungen von Extrakt von Bering, der aus einem Tumor gewonnen worden war, erwähnt.

Endgültige Anerkennung hat von allen diesen therapeutischen Maßnahmen keine gefunden. Sie wurden trotz zuweilen berichteter subjektiver Besserung alle wieder aufgegeben; allgemein bestätigt wird dagegen die günstige Wirkung des Arsens auf den Krankheitsprozeß. Die Applikation erfolgt in Form von asiatischen Pillen oder intravenösen Injektionen von *Acidum arsenicosum* steigend von 0,001 g bis 0,01 g und dann wieder fallend bis 0,001 g (*Hirsch*), seitdem es *Köbner* in einem Fall gelang, durch konsequente Darreichung von As, Heilung zu erzielen (*Joseph*). Ferner gelingt es, durch Röntgenbestrahlungen, die zum ersten Male von *Scholtz* bei der *Mycofisis fungoides* durchgeführt wurden, einen Zerfall der jeweils bestehenden pathologischen Infiltrate herbeizuführen, und so wenigstens eine vorübergehende Besserung zu erzielen, die sich dadurch anzeigt, daß der Juckreiz aufhört, und daß sich die Tumoren unter Braunfärbung der Haut zurückbilden. Freilich wird die Grundursache der Erkrankung nicht dadurch beeinflußt, und das Bestreben, empirisch ein spezifisch gegen die *Mycofisis fungoides* wirkendes Mittel zu finden, erscheint deshalb auch heute noch angebracht. Bei etwaigem Fehlschlag solcher

Verfuche bleibt dann die kombinierte Arfen-Röntgentherapie immer als stets erfolgversprechend und wenigstens lebensverlängernd anwendbar.

In der Literatur findet sich eine einzige Angabe eines Versuches vor, mit Hilfe von Goldpräparaten eine Heilung herbeizuführen.

Throne verfuchte bei einer Mycosiskranken, die drei Jahre nach Abheilung eines Lupus erythematodes prämycotische Erscheinungen aufwies, die Heilung durch Goldpräparate zu erzielen, in der Annahme, daß ätiologische Beziehungen der Mycosis fungoides mit dem Lupus erythematodes vorhanden seien. Die Behandlung blieb erfolglos. Die Wirkung faßt er mit folgenden Worten zusammen: The only changes that have taken place have been those due to mycosis fungoides. Some lesions have disappeared, but others have reappeared in other places. The gold injections may have caused the angry appearances of the facial lesions."

In der hiesigen Klinik wurde der weitere Versuch unternommen, die Mycosis fungoides durch das Goldpräparat „Lopion“ (*Wirz*) = $C_6H_4 \begin{smallmatrix} COONa \\ NH(C_3H_5NCSAu) \end{smallmatrix}$, das in der Behandlung des Lupus erythematodes und der Tuberkulide eine Rolle spielt, zu beeinflussen, und, so weit es sich bis jetzt feststellen läßt, mit befriedigendem Resultat.

Im Anschluß hieran möchte ich über einen Fall berichten, der in der hiesigen Klinik zur Beobachtung gelangte.

1. KRANKENBLATT.

Anamnese:

Name des Patienten: P. H.

Alter: 52 Jahre.

Beruf: Fabrikarbeiter.

Tag der Aufnahme: 30. 5. 28.

Tag der Entlassung: 30. 6. 28.

Familienanamnese: o. B.

1921 hatte P. eine Nierenerkrankung. 1923 traten unter starkem Jucken an den Beinen und am Körper erst blasse, allmählich zu Dreimarkstückgröße anwachsende, an-

fangs rötlich-braune, dann braun bis livide verfärbte Flecken auf, die meistens kreisrund waren. Die Flecken schwanden von allein, kamen aber immer wieder.

1927 begab sich P. in ärztliche Behandlung. Die Erscheinungen verschwanden fast ganz, vor allem ließ das Jucken nach. Die Beschwerden kamen jedoch bald wieder, das Jucken wurde unerträglich, P. wurde deshalb der Klinik überwiesen.

STATUS PRÄSENS: Mittelgroßer und kräftiger Mann in gutem Allgemeinzustand, Haut und sichtbare Schleimhäute gut durchblutet.

Kopf, Rachenorgane, Hals: o. B.

Augen frei beweglich, Pupillen reagieren prompt auf L. und C.

Bruft und Bauchorgane: o. B.

Extremitäten und Nervensystem: o. B.

Haut: Am Stamm und Extremitäten trägt die Haut zahlreiche Herde von Erbse- bis Fünfmarkstückgröße. Einzelne Herde sind leicht infiltriert, überragen das Niveau der umgebenden Haut. Die Farbe schwankt von frischrot, bräunlichrot, braun bis livide. Einzelne Herde lassen ganz geringe Schuppungen erkennen. Knötchen sind nirgends nachzuweisen, an den Beinen finden sich an und um die Effloreszenzen Kratzeffekte. Am Oberarm sind die Herde mit Krusten und Borken bedeckt und nässen teilweise (infolge des Kratzens).

Blutuntersuchung: Wa. R. negativ.

M. Tr. R. negativ.

Urinuntersuchung: Eiweiß positiv.

Sediment: wenig Erythrocyten.

Diagnose: Erythrodermia maculosa perstans.

Therapie:

31. 5. P. wird auf salzarme Diät gesetzt.
2. 6. Beginn der ersten Röntgenbestrahlung ($3 \times + 2$ Alf).
5. 6. P. erhält abends leichte Hypnotica und tags $1 \times$ Sedobrol. Es wurde versucht, den Arm mit Perufalbe zu behandeln.

10. 6. Auf den Körper Tumenolzinkpastes. Gegen das abendliche Jucken erhält P. Sedobrol. 2. Röntgenbehandlung. 1. Solaninjektion ($2 \times 0,3$ ccm intramuskulär).
16. 6. Solaninjektion ($2 \times 0,3$ ccm intracutan). Das Jucken am Körper hat bedeutend nachgelassen. Täglich $1 \times$ Sedobrol. Auf dem linken Arm Behandlung mit Tumenolzinköl.
19. 6. Unter dem Tumenolzinköl sind am Arm bei starkem Jucken zahlreiche urtikarielle Effloreszenzen aufgetreten. Tumenolzinköl abgesetzt. Tags Kaliumpermanganat, abends Schwefelzinkpastes.
20. 6. P. erhält ab heute täglich 3×2 Tabletten Kalzan. Die urtikariellen Ausschläge am Arm sind fast abgeklungen. Auf die Herde am Körper, die nur noch selten jucken, Tumenolzinkpastes.
26. 6. Gestern und heute Röntgenbehandlung ($5 \times + 2$ mm Alf. 18 Pof.)
30. 6. 28. Die Herde am Körper machen keine Beschwerden mehr. Die Pigmentation ist abgeblaßt, man sieht noch geringe blaßbräunliche Verfärbung. Auch die Herde am Arm sind blässer geworden, sind wenig rotbraun verfärbt und nur noch schwach über die Haut erhaben. P. wird gebessert entlassen.

2. KRANKENBLATT.

2. Aufnahme: 15. 8. 1929.

2. Entlassung: 28. 9. 1929.

Status praesens: Allgemeiner Befund wie im früheren Krankenblatt.

Haut: Am Stamm und Extremitäten befinden sich zahlreiche, im allgemeinen erbsen- bis fünfmarkstückgroße, bräunliche, rotbräunliche Herde, — im Rücken ein solcher von 20 cm Länge und 2,5 cm Breite — die gering schuppen und teilweise wenig erhaben sind. Es zeigen sich weder Knötchen noch sonstige Effloreszenzen. Die Herde sollen stark jucken.

16. 8. Auf die stark juckenden Stellen 2⁰/₀ige Tumenol-zinkpaste. 10⁰/₀ige Salizylfalbe.
19. 8. Balnacid-Bad. 2⁰/₀ige Tumenolzinkpaste, 2×2 Tabletten Kalzan.
21. 8. 5⁰/₀ige Tumenolzinkpaste.
22. 8. Auf Trichophytin 1:100 keine Reaktion.
25. 8. Ein Teil der Herde bildet sich zurück, dafür entstehen aber neue quaddelartige, stark juckende Herde. 10⁰/₀ige Tumenolzinkfalbe, 3×2 Kalzan-Tabletten.
27. 8. Blutbild: 80 Hgl., 7600 Lkz., 3840000 Erythr.
4⁰/₀ Eos., 72⁰/₀ Neutroph., 24⁰/₀ Lymph.
Röntgenbefstrahlung (5×1 mm Alf. 6 Pof.) 10 ccm Calcium-Sandoz intramuskulär.
2. 9. Da die intramuskulären Injektionen von Calc.-Sandoz nur geringe Wirkung haben, werden gleichzeitig 10 ccm intravenös und intramuskulär (alle 2 Tage) gegeben.
7. 9. Die Herde flachen gut ab. Therapie idem.
11. 9. Probeexcision aus dem großen Herd am Rücken.
14. 9. Unter der Behandlung mit Calc.-Sandoz haben sich die Herde so weit zurückgebildet, daß sie in derselben Höhe liegen wie die übrige Haut. Der große Herd am Rücken ist unverändert rot, ragt etwas über das Niveau der Haut, während die übrigen Herde leichte Pigmentation zeigen. 10⁰/₀ Schwefelzinkpaste.
17. 9. Der mikroskopische Befund zeigt Spongiose und Verdünnung der Epidermis, starke kleinzellige Infiltration der Cutis. Das Bindegewebe scheint leicht gequollen zu sein. Urticaria chronica perstans.
21. 9. Nach den beiden Röntgenbefstrahlungen am 18. und 19. 9. leidet Patient jedesmal unter den starken Nachwirkungen. Die Herde sind immer noch stark pigmentiert und liegen in gleicher Höhe der normalen Haut. Das Jucken tritt nur noch selten auf.

28. 9. Entlassungsbefund: Sämtliche Herde sind mit einer stark pigmentierten, rötlichbraunen Haut überzogen; die verfärbten Stellen sind vollkommen reaktionslos. Es bestehen aber noch leichte nervöse Beschwerden, Kopfschmerzen, geringe Schwerhörigkeit und etwas gesteigerte Reflexe.

3. KRANKENBLATT.

3. Aufnahme am 22. 4. 1930.

3. Entlassung am 14. 6. 1930.

Etwa 8 Wochen nach der letzten klinischen Behandlung sei der Ausschlag wieder aufgetreten.

Status präsens: Kleiner, blaß aussehender, 54jähriger Mann, in reduziertem Ernährungszustand. Haut und Schleimhäute mäßig durchblutet. Allgemeinbefund zeigt keine Besonderheiten. Es lassen sich keine krankhaften Veränderungen an Herz und Lunge feststellen. Glieder sind frei beweglich, Sehnenreflexe sehr lebhaft, P. macht im ganzen einen äußerst nervösen Eindruck. Auf Brust und Rücken bemerkt man einige z. T. über fünfmarkstückgroße runde Quaddeln, die in der Mitte blaß und wenig erhaben sind, an den Rändern dagegen stark gerötet und prominent. Am Rücken, rechts neben der Wirbelsäule und über der Beckenschaufel, befindet sich ein etwa handtellergroßer, scharf begrenzter, ovaler Herd, der das Niveau der Haut plattenförmig um 1—2 mm überragt (siehe Abbildung 1 und 2).

Dieser Herd ist deutlich infiltriert und zeigt intensive Rötung. In der Mitte befindet sich ein deutlich fühlbarer, rötter als die Umgebung erscheinender, markstückgroßer Tumor, der zu ulcerieren anfängt. In der Achselhöhle der gleichen Seite derbe knotige Lymphdrüsenanschwellung in ungefähr Hühnereigröße. Die übrige Haut ist etwas rauh, sonst aber ohne Erscheinungen. P. klagt über starkes Jucken. Er ist kaum von ständigem Schaben und Kratzen abzuhalten. Kopf und Gesicht sind frei von Erscheinungen. Leisten- und Achseldrüsen mäßig geschwollen.

BLUTUNTERSUCHUNG: Wa. R. und M. Tr. R. negativ.

Blutbild: Hgl. 65%, Erythroc. 3500000,

Weißer Blutk. 6000, Eos. 10%,

Stab. 4%, Segment 65%, Lymph. 18%,

Monocyten 3%.

24. 4. Probeexzision. Zur Beruhigung des sehr nervösen P. 3 × tgl. 1 Eßlöffel Mixtura nervina. Außerdem alle 2 Tage 10 ccm Bromo-strychnin zur Milderung des Juckreizes.

30. 4 Röntgenbestrahlung des Herdes auf dem Rücken und der rechten Achseldrüse (8 × 2 mm Alf.). Außerdem wird mit Goldtherapie begonnen. 1. Lopion-Injektion 0,01 gr. Sämtliche großen und kleineren Herde werden mit Tumenolzinkepaste behandelt.

3. 5. Temperaturanstieg bis 39°. Der rechte Arm ist geschwollen und deutliches Ödem festzustellen. Es handelt sich hier um eine entzündliche Stauung der Lymphe, die von den Achseldrüsen ausgeht. Ruhiglage, feuchte Umschläge verordnet.

7. 5. 2. Lopioninj. 0,02 g.

2. Röntgenbestrahlung wie vorher.

Das Infiltrat ist sehr gut zurückgegangen. Die Probeexzision ist abgeheilt und die kleineren Stellen, die die beschriebenen Veränderungen zeigten, sind flacher geworden. Sie unterscheiden sich nur noch von der umliegenden Haut durch den vermehrten Pigmentgehalt.

14. 5. 3. Lopioninj. 0,025 g.

Mixtura nervina wird ausgesetzt. Auf die noch juckenden kleinen Stellen wird tageweise Ichthyol purum gestrichen, wodurch der Juckreiz jedesmal aufhört. Sonstige Behandlung mit Tumenolzinkepaste weiter. Außerdem noch wöchentlich 1 Balnacid-Bad.

21. 5. 4. Lopioninj. 0,05 g.

24. 5. 3. Röntgenbestrahlung (8 × 1½ mm Alf.).

4. 6. 4. Röntgenbestrahlung (wie vorher).

Außerdem bekommt P. seit einigen Tagen Arsen-Tropfen zur Hebung des Allgemeinzustandes. Die anfäng-

lich infiltrierten Herde sind alle flach geworden, sie zeigen deutliche Pigmentierungen aber keine Rötung mehr. P. ist sehr nervös, bringt jeden Tag andere Beschwerden vor und versteift sich dabei auf eigene Therapievor schläge.

Die röntgenologische Magen-Darmuntersuchung ergab Formveränderung des Bulbus, sodaß der Verdacht auf ein Ulcus duodeni naheliegt. Ein sicherer Befund war nicht zu erheben.

10. 6. 5. Röntgenbestrahlung (wie vorher).

Einige kleinere Stellen wurden aus psycho-therapeutischen Gründen mitbestrahlt.

14. 6. 6. Röntgenbestrahlung (3×0.5 F.).

P. als gebessert entlassen und zum 27. 6. zur Nachschau wieder bestellt.

27. 6. 30. Befund: Der große Herd am Rücken ist glatt, ohne Infiltrat, aber intensiv pigmentiert. An den Schulterblättern, am Stamm sowie an den Oberschenkeln kleine typische Herde mit blassem Aussehen und wallartigen Rändern. Allgemeinbefund sehr gut. Ambulant 0,01 Lopion.

10.10.30. Fünfmarkstückgroßer Herd über dem alten pigmentierten Flecken. Am linken Schulterblatt und am linken Gluteus sind handtellergroße Herde entstanden. Lopioninjektion 0,01 g.

23. 10. 7. Röntgenbestrahlung (5×1 mm Alf.).

8. 11. 30. 8. und letzte Röntgenbestrahlung (wie vorher). Anschließend an den pigmentierten und abgeteilten Herd am Rücken hat sich an der oberen Grenze in die gesunde Haut hineinstreckend ein neues flaches, über fünfmarkstückgroßes Infiltrat gebildet, das stark schuppt und in der Mitte näßt (siehe Abbildung 1 und 2). Am übrigen Körper sind außerdem noch mehrere streifenförmig und periginös angeordnete Infiltrate zu bemerken. Allgemeinbefinden und psychischer Zustand gut. Hat von seinem Hausarzt 2 Lopioninjektionen von je 0,05 g erhalten.

13.12.30. Befund: Allgemeinzustand unverändert. Die alten Herde auf dem Rücken sind unter starker Pigmentation abgeheilt. In der Gegend der linken Hüfte sind wieder zwei neue leicht infiltrierte Herde, die stark gerötet sind, aufgetreten. Blutbild ergibt außer einer Eosinophilie nichts Besonderes.

Bei der ersten Aufnahme am 30. 5. 28 bestand der Verdacht auf „Erythrodermia maculosa perstans“. Auf Grund der Weiterentwicklung der klinischen Erscheinungen und des histologischen Befundes vom 17. 9. 29 mußte die Erkrankung als „Urticaria perstans“ angesehen werden, bis die endgültige Diagnose „Mycofis fungoides“ am 22. 4. 30 gestellt werden konnte. Differentialdiagnostisch sind die beiden erstgenannten Erkrankungsformen von der Mycofis fungoides abzutrennen. Es ist gleichfalls charakteristisch für sie, daß sie bei ungeklärter Ätiologie auch die vorgefundenen Effloreszenzen, die jahrelang bestehen und mit Juckreiz einhergehen, am Rumpf und an den Extremitäten verursachen und Pigmentanomalien hervorbringen können.

Das Auftreten eines intensiv geröteten Tumors, die Lymphdrüenschwellungen und die Verschlechterung des Allgemeinzustandes in diesem Maße sind jedoch Symptome, die nur die Diagnose „Mycofis fungoides“ aufkommen läßt. Die daraufhin durchgeführte mikroskopische Untersuchung bewies die Richtigkeit.

Die Probeexcision aus einem kleineren geröteten und leicht schuppigen Herd der linken Schulter ergab folgenden histologischen Befund. (Paraffin-Einbettung. Hämatoxylin-Eosin-Färbung, siehe Abbildung 3a und 3b).

Stellenweise liegt Parakeratose vor. Die Keratohyalinschicht im Stratum granulosum fehlt. Die Papillen sind bereits geringfügig pathologisch verändert. Im Stratum papillare macht sich mäßige Ödembildung bemerkbar, während im Stratum subpapillare ein strangförmig gestaltetes, polymorphzelliges Infiltrat vorliegt, das besonders um die Blutgefäße und um die Hautanhangsgebilde ausgeprägt ist. Eosinophile Zellen konnten im Infiltrat nicht nachgewiesen werden.

Nachstehende Abbildung 4a (4b = vergrößerte Aufnahme von 4a) stellt einen Schnitt aus der Mitte des Tumors dar. (Paraffin-Einbettung. Hämatoxylin-Färbung).

Die histologische Untersuchung war in diesem Falle ganz besonders dazu geeignet, die klinische Diagnose „*Mycosis fungoides*“ zu stützen, da hier ihre typischen Veränderungen nachgewiesen werden konnten.

Die Hornschicht ist kernlos und nicht hypertrophiert. Teilweise zeigt sie sich in dünnen Lamellen abgehoben. Die Keratohyalinschicht fehlt ebenfalls. Dagegen findet sich ein abwechselnd starkes intrazelluläres Ödem im Stratum papillare vor, sodaß es stellenweise zur intraepithelialer Bläschenbildung gekommen ist. Ein dichtes polymorphzelliges Infiltrat reicht vom Papillarkörper bis in die Subcutis. Die Infiltratzellen sind z. T. fäulenartig angeordnet und liegen in einem feinen Netzwerk von Bindegewebsfibrillen. Protoplasmareiche Zellformen, die einen blassen, unregelmäßig geformten, großen Zellkern enthalten, lassen sich in großer Anzahl erkennen. Daneben beobachtet man das reichliche Vorkommen von Lymphocyten, Plasmazellen und Eosinophilen. Die Blut- und Lymphbahnen zeigen sich in der subpapillären Schicht stark erweitert. Die Hautanhangsgebilde, die zwar dicht vom Infiltrat umlagert sind, erweisen sich dagegen als unverändert.

Im vorliegenden Fall konnte durch die angewandte kombinierte Lotion-Röntgentherapie eine Rückbildung der Hauterscheinungen — im besonderen des mycosiden Tumors auf dem Rücken — und eine Besserung im Allgemeinbefinden des Patienten in verhältnismäßig kurzer Zeit erzielt werden, ein Erfolg, der neben *Throne's* Veröffentlichung ganz besonders auffällig ist. Es ergibt sich daher auch weiterhin die Möglichkeit, mit Hilfe von Goldpräparaten — insbesondere der kombinierten Lotion-Röntgentherapie — eine bestehende „*Mycosis fungoides*“ prognostisch günstig zu beeinflussen.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, Herrn Professor Dr. Ruete für die Überlassung des Themas und für die gütige Unterstützung bei der Herstellung der photographischen Aufnahmen meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

Befonders danke ich auch Herrn Dr. Förster für die mir jederzeit freundlichst erteilten Auskünfte.

LEBENS LAUF.

Am 11. September 1907 wurde ich als Sohn des verstorbenen Volksschullehrers Karl Rosenstock und seiner ebenfalls verstorbenen Ehefrau Lina, geb. Fenner, zu Fulda geboren. Nach vierjährigem Besuch der Evangelischen Volksschule bestand ich die Aufnahmeprüfung für die Sexta der Oberrealschule zu Fulda. Ostern 1927 erhielt ich an dieser Schule das Zeugnis der Reife und ließ mich im Sommer-Semester 1927 als Studierender der Zahnheilkunde in Marburg immatrikulieren. Ende Oktober 1929 bestand ich die zahnärztliche Vorprüfung in Marburg mit „gut“, nachdem ich im Sommer-Semester 1929 in München studiert hatte. Am 8. Mai 1931 bestand ich mein Staatsexamen vor dem zahnärztlichen Prüfungsausschuß zu Marburg. Meine klinische Ausbildung erhielt ich in Marburg. Meine Lehrer waren: Privatdozent Dr. Arndt, Professor v. Auwers, Professor Boeminghaus, Professor Dittler, Oberarzt Dr. Eimer, Privatdozent Dr. Fliege, Professor Goeppert, Professor Grüneisen, Professor Gürber, Professor Hauenstein, München; Professor Kranz, München; Dr. Loebell, Oberarzt; Professor Nauck, Professor Pfannenstiel, Professor Ruete, Professor Schmitt, Professor Schneider, München; Professor Seidel, Professor Verfé.

Marburg, den 28. 9. 1931.

HEINZ ROSENSTOCK,
Zahnarzt.


LITERATUR-VERZEICHNIS.

- Abraham und Sachs: citiert nach Paltauf Monogr. in Mracek's Hand-
buch Hautkrankheiten: Bd. 4, 2 S. 762.
- Afzelius: Dermatol. Wochenschrift Bd. 60 S. 77.
- Arita: Dermatol. Zentralbl. Bd. 16, S. 421.
- Arzt: Dermatol. Wochenschrift Bd. 90, S. 288.
Dermatol. Wochenschrift Bd. 91, S. 1313.
- Bering: Zentralbl. f. Haut- und Geschlechtskrankheiten
Bd. 21, S. 48.
- Brandweiner: Dermatol. Monatshefte Bd. 41, S. 416, 424, 425.
- Brünauer: Deutsche Med. Wochenschrift 1926 S. 2030.
- Crull: citiert nach Brandweiner S. 429.
- Darier: Précis de Dermatologie S. 842, 844.
- Daries: Dermatol. Wochenschr. Bd. 91, S. 1801.
- Decrop und Salle: Zentralbl. Bd. 2, S. 67.
- During: citiert nach Paltauf S. 695.
- Eichler: Archiv f. Dermat. und Syph. Bd. 154, S. 322.
- Frieboes: Atlas der Haut- und Geschl.-Krankheiten Bd. 2,
S. 404, 405 und 406.
- Frieboes: Grundriß d. Histol. d. Hautkrankheiten Bd. 2, S. 276.
- Gans: Histologie d. Hautkrankheiten S. 566, 569, 570.
- Gerwig: Archiv f. Dermatol. Bd. 156, S. 681.
- Gödel: Archiv f. Dermatol. Bd. 130, S. 177 und 184.
- Gougerot: Bulletin de la Société Française de Dermatologie
et de Syphiligraphie 1931, Heft 1, S. 50.
- Habermann: Dermatol. Wochenschrift Bd. 90, S. 352.
- Herxheimer u. Martin: Lehrbuch d. Haut- und Geschl.-Krankheiten, Ber-
lin 1929, Bd. 8, 1, S. 174, 175, 176, 177, 181, 186,
194, 206, 208, 222, 225, 226, 231, 233, 234, 238
und 248.
- Hirsch: Dermatol. Monatshefte Bd. 50, S. 434.
- Joseph: Lehrbuch der Hautkrankheiten S. 416, 419.
- Kaposi: citiert nach Herxheimer S. 174.
Zentralblatt f. Haut- und Geschl.-Krankheiten
Bd. 20, S. 417.

- Köbner: citiert nach Paltauf S. 695.
- Kyrle: Histobiologie der menschlichen Haut und ihrer Erkrankungen Bd. 2, S. 276.
- Laubal: Dermatol. Wochenschrift Bd. 91, S. 1034.
- Lenfchow: citiert nach Paltauf S. 764.
- Leuwen, van: Zentralblatt f. Haut- und Geschl.-Krankheiten Bd. 36, Heft 11/12, S. 716.
- Lindenheim: Dermatol. Zeitschrift Bd. 23, S. 462, 463, 464, 466 und 467.
- Mariani: Archiv f. Dermatologie Bd. 120, S. 853, 859.
- Martin-Roux: citiert nach Paltauf S. 764.
- Milian und Perin: Zentralblatt f. Haut- und Geschl.-Krankheiten Bd. 16, S. 562.
- Nobl und Sukmann: Zentralblatt f. Haut- und Geschl.-Krankheiten Bd. 16, S. 905.
- Olion: Zentralblatt f. Haut- und Geschl.-Krankheiten Bd. 16, S. 350.
- Paltauf: Monographie in Mracek's „Handbuch der Hautkrankheiten“ Bd. 4, 2 S. 707, 712, 714, 747, 750, 751, 752 und 772.
- Pautrier und Levy: Zentralblatt f. Haut- und Geschl.-Krankheiten Bd. 15, S. 350.
- Pick, Völker, Laffer u. Brandweiner: citiert nach Herxheimer S. 181.
- Riecke: Archiv f. Dermatologie und Syph. Bd. 67, S. 208, 217.
- Ruete: Differentialdiagnostischer Führer durch die Dermatologie S. 116 und 117.
- Schäffer: Archiv f. Dermatologie und Syph. Bd. 64, S. 427.
- Scholtz: Archiv f. Dermatologie und Syph. Bd. 59, S. 443.
- Sederholm: Dermatologische Monatschrift Bd. 39, S. 269.
- Spiethoff: Dermatologische Zeitschrift Bd. 17, S. 656.
- Schwartz u. Busmann: Zentralblatt f. Haut- und Geschl.-Krankheiten Bd. 35, Heft 1/2, S. 108.
- Throne: Archives of Derm. and Syph. Bd. 16, S. 800.
- Trautmann: Die Krankheiten der Mundhöhle und der oberen Luftwege bei Dermatosen. S. 626.
- Ullmann: Dermatologische Monatshefte Bd. 39, S. 636.
- Unna: Histopathologie der Hautkrankheiten. Berlin 1894. S. 507, 508, 509, 510, 513, 514.
- Unna: Dermantol. Wochenschrift Bd. 91, S. 1578.
- Vollmer: Archiv f. Derm. und Syph. Bd. 58, S. 66.

- Werther: Dermatol. Wochenschrift Bd. 90, S. 319.
- Werther: Zentralblatt f. Haut- und Geschl.-Krankheiten Bd. 16, S. 529.
- White und Burns: citiert nach Herxheimer S. 225.
- Wickham: citiert nach Lindenheim S. 462.
- Wolters: citiert nach Lindenheim S. 462.
- Wills und Headfields: Zentralblatt f. Haut- und Geschl.-Krankheiten Bd. 17, S. 532.
- Wirtz: Lotion-Gold-Behandlung bei Lupus erythematosus und Tuberkuliden. Münchener Med. Wochenschrift 1930. S. 117.
- Wolff: Dermatol. Wochenschrift Bd. 59, S. 851.
- Zinsser: Handbuch d. Haut- und Geschl.-Krankheiten. Bd. 14, 1, S. 33.
- Zumbusch: Archiv f. Dermatologie und Syphilis Bd. 78, S. 269.
-

BILDER-ANHANG



BILDER-ANHANG




Abbildung 1



Abbildung 2

